

# Program tretiranja biljaka sa proizvodima EkoBooster 2(EB2)

Kultura	1.tretman	2.tretman	3.tretman
<b>Kukuruz</b>	Prilikom izbivanja 3 stalna lista tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2. Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	
<b>Suncokret</b>	Prilikom izbivanja 3 stalna lista tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	
<b>Šećerna repa</b>	Prilikom izbivanja 3 stalna lista tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	Ovaj tretman raditi u julu ili avgustu mesecu ,24sata pre mogućeg stresa biljke (naglo zahladjenje, visoke temperature,..) sa 0,5% rastvorom
<b>Soja</b>	Prilikom izbivanja prve trolistke tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	Ovaj tretman raditi u julu ili avgustu mesecu ,24sata pre mogućeg stresa biljke (naglo zahladjenje, visoke temperature,..) sa 0,5% rastvorom EB2.
<b>Krmno bilje (lucerka,crvena I bela detelina..)</b>	Prilikom izbivanja prve trolistke tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	Posle svake košnje i izbivanja novih listova ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Posle svake košnje i izbivanja novih listova ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.

<b>Uljana repica</b>		U martu mesecu tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	
<b>Pšenica,ječam</b>		Posle osnovne prehrane Ureom tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	
<b>Jabuka</b>		Posle cvetanja folijarno tretirati sa 0,5% EB2	Posle narednih 15 dana tretirati sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Kruška</b>		Posle cvetanja folijarno tretirati sa 0,5% EB2	Posle narednih 15 dana tretirati sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Vinova loza</b>		Posle cvetanja folijarno tretirati sa 0,5% EB2	Posle narednih 15 dana tretirati sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Breskva</b>		Posle cvetanja folijarno tretirati sa 0,5% EB2	Posle narednih 15 dana tretirati sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Šljiva</b>		Posle cvetanja folijarno tretirati sa 0,5% EB2	Posle narednih 15 dana tretirati sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Višnja, Trešnja</b>		Posle cvetanja folijarno tretirati sa 0,5% EB2	Posle narednih 15 dana tretirati sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Jagoda</b>		Posle cvetanja folijarno tretirati sa 0,5% EB2	15 dana posle Ponoviti tretman sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode) preventivno posle narednih 15 dana tretirati sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .

<b>Malina</b>	Posle cvetanja folijarno (preko lista) tretirati sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Kupina</b>	Posle cvetanja folijarno (preko lista) tretirati sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Borovnica</b>	Posle cvetanja folijarno (preko lista) tretirati sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Ribizla</b>	Posle cvetanja folijarno (preko lista) tretirati sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Lešnik i Dunja</b>	Po ozelenjavanju grana tretirati folijarno (preko lista) sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Paradajz</b>	Rasad u toku rasta u kontejneru tretirati folijarno sa 0,3% EB2. Po rasađivanju tretirati folijarno (preko lista) sa 0,5% EB2.	15 dana posle rasađivanja na stalno mesto folijarno tretirati sa 0,3% a 15 dana posle tog tretmana ponoviti prskanje sa 0,5% sve sa EB2.	Svaki sledeći tretman odratiti po potrebi , ne češće od 15 dana , sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Paprika</b>	Rasad u toku rasta u kontejneru tretirati folijarno sa 0,3% EB2. Po rasađivanju tretirati folijarno (preko lista) sa 0,5% EB2.	15 dana posle rasađivanja na stalno mesto folijarno tretirati sa 0,3% a 15 dana posle tog tretmana ponoviti prskanje sa 0,5% sve sa EB2.	Svaki sledeći tretman odratiti po potrebi , ne češće od 15 dana , sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Krastavac, lubenica i dinja, tikva</b>	Rasad u toku rasta u kontejneru tretirati folijarno sa 0,3% EB2. Po rasađivanju tretirati folijarno (preko lista) sa 0,5% EB2.	15 dana posle rasađivanja na stalno mesto folijarno tretirati sa 0,3% a 15 dana posle tog tretmana ponoviti prskanje sa 0,5% sve sa EB2.	Svaki sledeći tretman odratiti po potrebi , ne češće od 15 dana , sa 0,5% rastvorom EB2 .

<b>Krompir</b>	Prilikom izbivanja 3 stalna lista tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi u julu ili avgustu mesecu ,24sata pre mogućeg stresa biljke (naglo zahladjenje, visoke temperature,..) sa 0,5% rastvorom EB2
<b>Mahunasto povrće</b>	Posle cvetanja folijarno (preko lista) tretirati sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	Svaki sledeći tretman odratiti po potrebi , ne češće od 15 dana , sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Kupusasto povrće</b>	Rasad u toku rasta u kontejneru tretirati folijarno sa 0,3% EB2. Po rasađivanju tretirati folijarno (preko lista) sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).
<b>Mrkva,paštrnak,p eršun,celer</b>	Prilikom izbivanja 3 stalna lista tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi u julu ili avgustu mesecu ,24sata pre mogućeg stresa biljke (naglo zahladjenje, visoke temperature,..) sa 0,5% rastvorom EB2
<b>Lukovičasto povrće</b>	Prilikom formiranja zelenih "pera" folijarno (preko lista) tretirati sa 0,5% EB2. Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	Svaki sledeći tretman odratiti po potrebi , ne češće od 15 dana , sa 0,5% rastvorom EB2 . Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).
<b>Salata</b>	Rasad u toku rasta u kontejneru tretirati folijarno sa 0,2% EB2. Po rasađivanju tretirati folijarno (preko lista) sa 0,3% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	Svaki sledeći tretman odratiti po potrebi , ne češće od 15 dana , sa 0,5% rastvorom EB2 .
<b>Duvan</b>	Rasad u toku rasta u kontejneru tretirati folijarno sa 0,2% EB2. Po rasađivanju tretirati folijarno (preko lista) sa 0,3% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	

<b>Ruže i ukrasno bilje</b>	Po ozelenjavanju grana tretirati folijarno (preko lista) sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Svaki sledeći tretman odratiti po potrebi , ne češće od 15 dana , sa 0,5% rastvorom EB2 .
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

## **Ekopatent doo**

Odeljenje za istraživanje i razvoj