

Program tretiranja biljaka sa proizvodima

EkoBooster 1(EB1) , EkoBooster 2(EB2), EkoVital(EV) i

EkoFreez(EF)

Kultura	1.tretman	2.tretman	3.tretman	4.tretman
Kukuruz	Tretirati seme sa čistim koncentratom EB1 u odnosu 1dl EB1 na 10 kg semena, može se koristiti sa postojećim fungicidima .	Prilikom izbijanja 3 stalna lista tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2. Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	
Suncokret	Tretirati seme sa čistim koncentratom EB1 u odnosu 1dl EB1 na 20 kg semena, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	Prilikom izbijanja 3 stalna lista tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	
Šećerna repa		Prilikom izbijanja 3 stalna lista tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	Ovaj tretman raditi u julu ili avgustu mesecu ,24sata pre mogućeg stresa biljke (naglo zahladjenje, visoke temperature,..) sa 0,5% rastvorom EB2 i EF pomešanih zajedno.

Soja	Tretirati seme sa čistim koncentratom EB1 u odnosu 1dl EB1 na 20 kg semena, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	Prilikom izbijanja prve trolistke tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	Ovaj tretman raditi u julu ili avgustu mesecu ,24sata pre mogućeg stresa biljke (naglo zahladjenje, visoke temperature,...) sa 0,5% rastvorom EB2.
Krmno bilje (lucerka,crvena i bela detelina..)	Tretirati seme sa čistim koncentratom EB1 u odnosu 1dl EB1 na 20 kg semena, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	Prilikom izbijanja prve trolistke tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	Posle svake košnje i izbijanja novih listova ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Posle svake košnje i izbijanja novih listova ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.
Uljana repica	Tretirati seme sa čistim koncentratom EB1 u odnosu 1dl EB1 na 20 kg semena, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	U martu mesecu tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	
Pšenica,ječam	Tretirati seme sa čistim koncentratom EB1 u odnosu 1dl EB1 na 20 kg semena, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	Posle osnovne prehrane Ureom tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	

Jabuka	Na proleće kroz sisteme kap po kap zaliti sa 1% rastvorom EB1.	Prilikom izbijanja listova a pre cvetanja preventivno protiv mraza tretirati sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode) .	15 dana posle Ponoviti tretman sa 0,75% EF preventivno posle narednih 15 dana tretirati sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
Kruška	Na proleće kroz sisteme kap po kap zaliti sa 1% rastvorom EB1.	Prilikom izbijanja listova a pre cvetanja preventivno protiv mraza tretirati sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode). preventivno posle narednih 15 dana tretirati sa 0,5% rastvorom EB2.	15 dana posle Ponoviti tretman sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode)	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
Vinova loza	Na proleće kroz sisteme kap po kap zaliti sa 1% rastvorom EB1.	Prilikom izbijanja listova a pre cvetanja preventivno protiv mraza tretirati sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode).	15 dana posle Ponoviti tretman sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode)	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
Breskva	Na proleće kroz sisteme kap po kap zaliti sa 1% rastvorom EB1.	Prilikom izbijanja listova a pre cvetanja preventivno protiv mraza tretirati sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode).	15 dana posle Ponoviti tretman sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode)	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .

Šljiva	Na proleće kroz sisteme kap po kap zaliti sa 1% rastvorom EB1.	Prilikom izbijanja listova a pre cvetanja preventivno protiv mraza tretirati sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode). preventivno posle narednih 15 dana tretirati sa 0,5% rastvorom EB2.	15 dana posle Ponoviti tretman sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode)	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
Višnja, Trešnja	Na proleće kroz sisteme kap po kap zaliti sa 1% rastvorom EB1.	Prilikom izbijanja listova a pre cvetanja preventivno protiv mraza tretirati sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode).	15 dana posle Ponoviti tretman sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode)	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
Jagoda	Tretirati seme sa 1% rastvorom EB1, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	Prilikom izbijanja listova a pre cvetanja preventivno protiv mraza tretirati sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode).	15 dana posle Ponoviti tretman sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode)	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
Malina	Na proleće kroz sisteme kap po kap zaliti sa 1% rastvorom EB1.	Posle cvetanja folijarno (preko lista) tretirati sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
Kupina	Na proleće kroz sisteme kap po kap zaliti sa 1% rastvorom EB1.	Posle cvetanja folijarno (preko lista) tretirati sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .

Borovnica	Na proleće kroz sisteme kap po kap zaliti sa 1% rastvorom EB1.	Posle cvetanja folijarno (preko lista) tretirati sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
Ribizla	Na proleće kroz sisteme kap po kap zaliti sa 1% rastvorom EB1.	Posle cvetanja folijarno (preko lista) tretirati sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
Lešnik i Dunja	Na proleće kroz sisteme kap po kap zaliti sa 1% rastvorom EB1.	Po ozelenjavanju grana tretirati folijarno (preko lista) sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi krajem jula i početkom avgusta sa 0,5% rastvorom EB2 .
Paradajz	Tretirati semе sa 1% rastvorom EB1, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	Rasad u toku rasta u kontejneru tretirati folijarno sa 0,3% EB2. Po rasađivanju tretirati folijarno (preko lista) sa 0,5% EB2.	15 dana posle rasađivanja na stalno mesto folijarno tretirati sa 0,3% a 15 dana posle tog tretmana ponoviti prskanje sa 0,5% sve sa EB2.	Svaki sledeći tretman odratiti po potrebi , ne češće od 15 dana , sa 0,5% rastvorom EB2 . Na jesen za produženo branje pre mraza tretirati sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode).
Paprika	Tretirati semе sa 1% rastvorom EB1, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	Rasad u toku rasta u kontejneru tretirati folijarno sa 0,3% EB2. Po rasađivanju tretirati folijarno (preko lista) sa 0,5% EB2.	15 dana posle rasađivanja na stalno mesto folijarno tretirati sa 0,3% a 15 dana posle tog tretmana ponoviti prskanje sa 0,5% sve sa EB2.	Svaki sledeći tretman odratiti po potrebi , ne češće od 15 dana , sa 0,5% rastvorom EB2 .Na jesen za produženo branje pre mraza tretirati sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode).

Krastavac,lubenica dinja,tikva	Tretirati seme sa 1% rastvorom EB1, ili zaliti pripremljena mesta za sadnju sa 1% EB1.	Rasad u toku rasta u kontejneru tretirati folijarno sa 0,3% EB2. Po rasađivanju tretirati folijarno (preko lista) sa 0,5% EB2.	15 dana posle rasađivanja na stalno mesto folijarno tretirati sa 0,3% a 15 dana posle tog tretmana ponoviti prskanje sa 0,5% sve sa EB2.	Svaki sledeći tretman odratiti po potrebi , ne češće od 15 dana , sa 0,5% rastvorom EB2 . Za produženo branje pre mraza tretirati sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode).
Krompir	Tretirati seme sa 1% rastvorom EB1, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	Prilikom izbijanja 3 stalna lista tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi u julu ili avgustu mesecu ,24sata pre mogućeg stresa biljke (naglo zahladjenje, visoke temperature,..) sa 0,5% rastvorom EB2 i EF pomešanih zajedno.
Mahunasto povrće	Tretirati seme sa 1% rastvorom EB1, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	Posle cvetanja folijarno (preko lista) tretirati sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	Svaki sledeći tretman odratiti po potrebi , ne češće od 15 dana , sa 0,5% rastvorom EB2 .
Kupusasto povrće	Tretirati seme sa 1% rastvorom EB1, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	Rasad u toku rasta u kontejneru tretirati folijarno sa 0,3% EB2. Po rasađivanju tretirati folijarno (preko lista) sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).

Mrkva,paštrnak,peršun,celer	Tretirati seme sa 1% rastvorom EB1, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	Prilikom izbijanja 3 stalna lista tretirati preko lista , sa EB2 u koncentraciji od 0,5% . Tom prilikom se može preparat mešati sa svim postojećim herbicidima.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Ovaj tretman raditi u julu ili avgustu mesecu ,24sata pre mogućeg stresa biljke (naglo zahladjenje, visoke temperature,...) sa 0,5% rastvorom EB2 i EF pomešanih zajedno.
Lukovičasto povrće	Tretirati seme sa 1% rastvorom EB1, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	Prilikom formiranja zelenih "pera" folijarno (preko lista) tretirati sa 0,5% EB2. Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	Svaki sledeći tretman odratiti po potrebi , ne češće od 15 dana , sa 0,5% rastvorom EB2 . Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).
Salata	Tretirati seme sa 1% rastvorom EB1, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	Rasad u toku rasta u kontejneru tretirati folijarno sa 0,2% EB2. Po rasađivanju tretirati folijarno (preko lista) sa 0,3% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	Svaki sledeći tretman odratiti po potrebi , ne češće od 15 dana , sa 0,5% rastvorom EB2 . Za produženo branje pre mraza tretirati sa 0,75% EF preko lista (2 lit/300 lit vode).
Duvan	Tretirati seme sa 1% rastvorom EB1, može se koristiti sa postojećim fungicidima.	Rasad u toku rasta u kontejneru tretirati folijarno sa 0,2% EB2. Po rasađivanju tretirati folijarno (preko lista) sa 0,3% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.Obavezno koristiti sa okvašivačem (lepkom).	

Ruže i ukrasno bilje	Na proleće kroz sisteme kap po kap zaliti sa 1% rastvorom EB1	Po ozelenjavanju grana tretirati folijarno (preko lista) sa 0,5% EB2.	15 dana posle tretmana sa EB2 ponoviti tretman sa 0,5% rastvorom EB2.	Svaki sledeći tretman odratiti po potrebi , ne češće od 15 dana , sa 0,5% rastvorom EB2 .
-----------------------------	---	---	---	---

EkoVital

Pre osnovnog đubrenja u jesen strnište sa svim žetvenim ostacima na njivi tretirati sa 2 litre EkoVital preparatom na 1 ha. Preporuka je da se pored 2 litre EkoVitala u prskalicu doda još 15 kg Uree i sve zajedno rastvori u 200-250 litara vode i zatim poprskati njivu od 1 ha. Zaorati ili kultivirati u narednih 60 dana u zavisnosti od meteo uslova.Preparat EkoVital ne sadrži bakterije niti mikro-organizme pa na njegove efekte ne utiče temperatura niža od 0° C. EkoVital podstiče aktivnost žemljišta i razlaganju biljnih ostataka i njegovo pretvaranje u humus.

Ekopatent doo

Odelenje za istraživanje i razvoj